

CO - O - 065 - Higiene oral y tabaco en alumnos de 5º año de la carrera de odontología - UNC. 2011 - **SÁNCHEZ DAGUM M, URAN SP, ELIZONDO CASSAB E, GUTIÉRREZ MI**

La Organización Mundial de la Salud ha designado al tabaquismo como un verdadero problema de salud pública mundial. El objetivo del presente trabajo fue relacionar el consumo de tabaco y hábitos de higiene oral, que presentan los alumnos del último año de la Carrera de Odontología, U.N.C. El estudio se planteó de tipo cuali-cuantitativo, descriptivo, transversal, se fijó n=194 alumnos de ambos sexos, edad: 23 a 27 años a través de un muestreo probabilístico aleatorio. Los datos se recolectaron por encuesta semi-estructurada, auto-suministrada, diseñada ad-hoc.; las dimensiones estudiadas fueron: consumo de tabaco y hábitos de higiene oral. Se observó que el 31,44% correspondió a fumadores y 68,56% a no fumadores. Al analizar por sexo la muestra el 73,68% refirió a mujeres y el 26,32% a varones; en el grupo de fumadores el 34,43% refirió a varones y el 65,57% a mujeres. En hábitos de higiene oral: el 82,5% de mujeres fumadoras lo realizaba después de cada comida y el 17,5% una vez por día; en el grupo de varones el 95,24% lo hacía después de cada comida y solo el 4,76% una vez por día. Se exploraron también conocimientos, actitudes y patrones de comportamiento para mejorar la difusión sobre las consecuencias del tabaquismo y dotar a los alumnos del último curso de herramientas útiles para ofrecer consejo en prevención y cesación tabáquica; teniendo en cuenta que en el futuro serán agentes de cambio, al mejorar el modo y estilo de vida de la comunidad, lo que permite una mayor comprensión de las actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades, datos que se encuentran en procesamiento y análisis. Numerosos estudios realizados han demostrado la influencia del tabaco en el desarrollo de enfermedades en el sistema estomatognático.

Palabras Clave: **Estudiantes de odontología, higiene oral, tabaco**

CO - O - 101 - Estrategias de APS en zonas de alto riesgo - **ALBARRACÍN SA, RUEDA L, MEDINA M, PAPEL G, COSCARELLI N, MOSCONI E, IRIGOYEN S, TOMAS L, CANTARINI M, SAPORITTI F, SEARA S, TISSONE S**

Las estrategias de la Atención Primaria en Salud pretenden que el individuo y la comunidad conozcan y participen en la toma de conciencia de una vida saludable cumpliendo con las normas de la Organización Mundial de la Salud que establece la estrategia de Atención Primaria de la Salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la educación permanente en salud en pacientes que concurren a la consulta en Unidades Periféricas de APS. La investigación consistió en un estudio descriptivo, el universo lo constituyeron 773 pacientes entre los años 2005, 2006 y 2007 en la zona de Hernández (La Plata, Buenos Aires) y en los años 2008, 2009 y 2010 en Gorina (La Plata, Buenos Aires). La recopilación de documentación se obtuvo a través de historias clínicas y entrevistas personales con los pacientes. Se elaboraron entrevistas estructuradas, encuestas para el relevamiento habitacional, diagramas para el registro de placas, odontogramas para el registro del índice CPO y ceo e índices de placa. Los datos se procesaron mediante el programa Microsoft Excel. De los 773 pacientes atendidos en las zonas estudiadas, 556 (71,93%) habían recibido educación permanente en salud y 217 (28,07%) concurren a la consulta sin haber recibido educación permanente en salud previamente. De los resultados obtenidos se concluye que la educación permanente en salud actúa como un factor determinante para promover en la población cubierta demanda espontánea de servicio para prevenir y reconvertir las patologías prevalentes de la cavidad bucal.

Palabras Clave: **Comunidad, educación, riesgo social**